

Abdômen Total:

- No dia antes do exame:
 - Tomar 60 gotas de luftal, pode ser a tarde.
 - Tomar uma sopa leve no jantar. Jejum a partir das 22:00h.
 - Tomar 1 comprimido de laxante, (o laxante deve ser um, que já tenha feito uso, orientamos a ingerir o medicamento após o almoço).
- Quando chegar ao hospital tomar 4 copos de água

Abdômen Superior

- No dia antes do exame.
 - Tomar 60 gotas de luftal, pode ser à tarde.
 - Tomar uma sopa leve no jantar. Jejum a partir das 22:00h.
 - Tomar 1 comprimido de laxante, (o laxante deve ser um, que já tenha feito uso, orientamos a ingerir o medicamento após o almoço).

Aparelho Urinário:

- Tomar um café leve.
- Quando chegar ao hospital tomar 4 copos de água.

Próstata Abdominal

- Tomar um café leve
- Quando chegar ao hospital tomar 4 copos de água

Próstata Transretal

- Jejum a partir das 22:00h.

- Tomar 1 comprimido de laxante, deve ser um que já tenha feito uso, orientamos a ingerir o medicamento após o almoço do dia antes do exame.

- Realizar um fleet enema pela manhã no dia do exame na sua residência (fleet enema é uma lavagem intestinal realizada em casa, o produto compra-se na farmácia, já vem pronto).

Obs: Se não realizar o fleet enema não há possibilidade de realizar o exame de próstata transretal.

U.S. Doppler de Membros Inferiores

- Mulheres: vir de saia ou vestido.

U.S. de Ombro

- Mulheres: vir de blusas regatas.

U.S. de Joelho

- homens e mulheres vir de bermuda ou calça com tecido macio.